



Cómo administrar a su hijo un medicamento utilizando un inhalador de dosis medida (IDM) con cámara de inhalación y mascarilla

Paso 1.

Controle el plan de atención del asma de su hijo(a) para ver cuándo debe administrarle el medicamento usando el IDM con cámara de inhalación y mascarilla.




¿Se está acabando el IDM?

Llame para renovar la receta antes de que se le acabe el inhalador.

Paso 2.

Revise la cámara.




Asegúrese de que que no haya objetos extraños en su interior.

Paso 3.

Quite la tapa del IDM.

Coloque el IDM en el anillo de caucho en la parte posterior de la cámara.



Paso 4.

Siente a su hijo(a) sobre su regazo. Sacuda el IDM y la cámara.



Paso 5.


Coloque la mascarilla sobre la cara de su hijo(a) y asegúrese de que quede firmemente adherida sobre la boca y la nariz.



*No se preocupe, su hijo(a) puede respirar con la máscara puesta.

Paso 6.

Empuje el IDM hacia abajo para hacer pasar una atomización de medicamento a la cámara.




Paso 7.

Mantenga la mascarilla en su lugar colocando su mano debajo del mentón de su hijo(a) hasta que el niño(a) inspire y exhale seis veces.



Paso 8.

Si le recetaron 2 inhalaciones de medicamento, espere 1 minuto y repita los pasos 4, 5, 6 y 7.



*Compruebe que su hijo(a) ha tomado el medicamento y respirado seis veces observando cómo sube y baja su pecho. También puede colocar su mano sobre el vientre de su hijo(a) y comprobar que se mueva hacia arriba y hacia abajo de seis a diez veces.

Paso 9.

Mantenga la cámara limpia.

Se debe lavar la cámara una vez a la semana. Lave la cámara y la mascarilla en un recipiente u olla limpios con agua caliente y detergente lavavajillas.

No enjuague. Deje secar naturalmente.

Nunca utilice una toalla para secar su espaciador.

Si la cámara se raja o rompe, es necesario reemplazarla.

